

avemar

liofilizátum [Oncomar]

daganatos betegek részére
stevia édesítőszerrel

speciális – gyógyászati célra szánt – tápszer

Felhasználói tájékoztató

1. Mi az Avemar liofilizátum [Oncomar]?

Az Avemar liofilizátum [Oncomar] speciális – gyógyászati célra szánt – tápszer daganatos betegek részére.

2. Mi az Avemar liofilizátum [Oncomar] aktív összetevője?

1 tasak (5,75 g) Avemar liofilizátum [Oncomar] 5,5 g fermentált búzacsíra-kivonatot tartalmaz. Az Avemar liofilizátum [Oncomar] egy speciális, szabadalommal védett, gyógyszer technológiai eljárással előállított, majd fagyasztva szárított kivonat, amelynek csupán kiindulási alapanyaga a **búza**csíra.

3. Mit tartalmaz még a készítmény?

Standardizált stevia-kivonatot, természetes narancs-aromát.

4. Mikor ajánlott az Avemar liofilizátum [Oncomar] alkalmazása?

Az Avemar liofilizátum [Oncomar] szedése ajánlott rosszindulatú daganatos megbetegedésben szenvedők klinikai onkológiai kezelésének (műtét, radioterápia, kemoterápia, immunterápia stb.) kiegészítésére. Az Avemar liofilizátumot [Oncomar] az onkológiai kezelések előtt, alatt és azok befejeződése után folyamatosan, megszakítás nélkül ajánlott alkalmazni. Az Avemar liofilizátum [Oncomar] a daganatos betegség bármely stádiumában szedhető. Műtétet követően az Avemar liofilizátum [Oncomar] szedését akkor lehet megkezdni, amikor a beteg szájon át történő táplálása (étkezés) legalább 4 nap óta zavartalanul megvalósult.

5. Mikor lehet elkezdni az Avemar liofilizátum [Oncomar] szedését?

Az Avemar liofilizátum [Oncomar] alkalmazását már a daganatos betegség felismerését követően érdemes megkezdni, nem szükséges az onkológiai kezelés kezdetét megvárni.

6. Mit kell tudni a szedés megkezdése előtt?

A készítmény nem használható egyedüli tápanyagforrásként! Az Avemar liofilizátum [Oncomar] alkalmazása nem helyettesíti az onkológiai kezeléseket és gyógyszereket!

7. Hogyan kell alkalmazni az Avemar liofilizátumot [Oncomar]?

Az Avemar liofilizátum [Oncomar] szedése folyamatosan, megszakítás nélkül ajánlott. Az onkológiai kezelések befejezése után a készítmény további – több éven át tartó – folyamatos alkalmazása ajánlott a teljes gyógyulásig. Amennyiben az Avemar liofilizátum [Oncomar] szedését valamilyen oknál fogva megszakította vagy szüneteltette, később elkezdheti újra.

8. Mikor nem szabad szedni a készítményt?

Terhesség és szoptatás során a készítmény nem szedhető. Szervi vagy szöveti transzplantációs beavatkozásban (szervátültetés) részesülő betegek részére az Avemar liofilizátum [Oncomar] alkalmazása szintén kizárt. Nem szedhető a készítmény a gasztrointesztinális traktus vérző eróziói, illetve ulcusai (vérző gyomor- és nyombélfekély), malabszorpciós szindróma (súlyos felszívódási zavar) esetén. Ugyancsak ellenjavallt a készítmény lisztérzékenység (cöliákia), vagy a készítmény bármely összetevőjére való túlérzékenység esetén.

9. Szedhetik-e cukorbeteg az Avemar liofilizátumot [Oncomar]?

Igen, cukorbeteg az Avemar liofilizátumot [Oncomar] alkalmazhatja, a szénhidrát tartalom figyelembevételével.

10. Mikor kell az Avemar liofilizátum [Oncomar] alkalmazását ideiglenesen szüneteltetni?

A tápszatombába juttatott kontrasztanyag vizsgálatok során (például bárium-szulfátos gyomor-bél röntgen-

diagnosztikai vizsgálat) javasolt az Avemar liofilizátum [Oncomar] használatát a vizsgálat előtt már 2 nappal felfüggeszteni, majd a vizsgálat utáni napon folytatni. PET/CT vizsgálat előtt ugyancsak javasolt az Avemar liofilizátum [Oncomar] alkalmazását 2 nappal korábban felfüggeszteni. Minden esetben a kezelőorvos utasítása az irányadó. Amennyiben a vizsgálatok, beavatkozások megkivánják, hogy a beteg éhgyomorral érkezzen, akkor ezt az Avemar alkalmazásánál is figyelembe kell venni.

11. Szedhetik-e gyermekek a készítményt?

A készítmény 14 évesnél idősebb kortól adható.

12. Milyen nem kívánt hatást válthat ki a készítmény?

Mellékhatások előfordulása rendkívül ritka; esetenként lágyabb széklet, hányinger, émelygés előfordulhat.

13. Szedhető-e az Avemar liofilizátum [Oncomar] más gyógyszerekkel, készítményekkel?

Igen, szedhető. C-vitamin, C-vitamin tartalmú készítmények és az Avemar liofilizátum [Oncomar] bevételük között legalább 2 óras szünetet kell tartani! Célszerű a készítményt a gyógyszerektől, gyógyhatású terméktől eltérő időpontban alkalmazni.

14. Hogyan kell az Avemar liofilizátumot [Oncomar] elkészíteni?

Egyszeri adag elkészítéséhez egy tasaknyi (5,75 g) Avemar liofilizátumot [Oncomar] töltsünk ki egy pohárba. Tetszés szerint öntsük fel 1-2 dl vízzel (szén-savmentes ásványvízzel), alaposan keverjük el, majd a kapott folyadékot igyuk meg. A fél órán belül el nem fogyasztott oldatot később felhasználni nem szabad! Az elkészítéshez használható üdítőital, tea, kefir, joghurt, kakaó vagy tej is. A tapasztalatok szerint a hűvös, hideg folyadék kellemesebben fogyasztható oldatot eredményez. Fontos, hogy az elkészítéshez használt folyadék ne legyen meleg vagy forró! C-vitamin tartalmú (aszorbinsavat vagy E 300 élelmiszer-adalékot tartalmazó) itallal való elkészítés nem ajánlott. Az Avemar liofilizátum [Oncomar] az előírás szerinti elkészítés után tápszondába is beadható (ekkor célszerűen kevés vízben feloldva).

15. Mennyi az ajánlott napi adag és mikor javasolt bevenni?

90 kg alatti testtömeg esetén naponta egy alkalommal egyszeri adag Avemar liofilizátum [Oncomar] bevételre javasolt, az előírás szerint elkészítve, lehetőleg étkezés előtt kb. 1 órával. 90 kg testtömeg felett naponta két alkalommal (reggel és este) egy-egy adag bevételre javasolt.

16. Hogyan kell tárolni és szállítani az Avemar liofilizátumot [Oncomar]?

Hőtől védve, száraz, hűvös helyen tárolandó. Javasolt 15°C alatt, lehetőleg hűtőszekrényben tartani. Mélyhűtést nem igényel. Gyermekektől elzárva tartandó! Ügyeljen arra, hogy a készítményt szállítás közben tartósan ne érje jelentős hőhatás.

17. Milyen tudományos vizsgálatok történtek az Avemarral?

Kérjük, tekintse meg a www.avemar.hu honlapot, ahol áttekintést kaphat azokról a rangos hazai és nemzetközi publikációkról, amelyek az Avemarral végzett klinikai vizsgálatok eredményeiről, tapasztalatairól számolnak be.

OEÍTI nyilvántartási szám: 1762/2014 (tápszer)

Amennyiben a felhasználói tájékoztató áttanulmányozása után további kérdése lenne, vagy az Avemar szedésével szerzett tapasztalatok kapcsán kérdése merülne fel, kérjük, hívja az Avemar Információs Központot a 06 (1) 2020 290-es telefonszámon, vagy írjon az aik@avemar.hu e-mail címre, illetve postán a 1123 Budapest, Kék Golyó u. 14. címre.

avemar
liofilizátum [Oncomar]
daganatos betegek részére
stevia édesítőszerrel